

Polder Mijzen en Beetskoog

Het vroege voorjaar van 2021 begon behoorlijk nat. De meeste percelen in Polder Mijzen en Beetskoog waren behoorlijk verzadigd en de greppels stonden lange tijd vol water. Het was dan ook dusdanig nat dat de meeste plasdraspompen niet op tijd konden worden geplaatst, aangezien deze veelal worden geplaatst aan de hoofdwatgang op het einde van de percelen. Zolang de greppels nog vol water stonden maakte de afwezigheid van enkele plasdraspomp ook niet het verschil.

Ondanks, of juist dankzij, het natte weer, waren de weidevogels eind maart al behoorlijk actief. Door de aanhoudende nattigheid en kou kwamen echter niet veel legfels uit of begonnen veel vogels toch later met het leggen van eieren. Hierdoor ontstond er in de loop van het seizoen een wisselend beeld van vogels met jongen terwijl andere nog maar pas op eieren zaten. Tevens bleef ook de grasgroei door de kou en nattigheid achter en kwam de eerste snede in zowel de Beetskoog als Polder Mijzen behoorlijk laat en werd er pas eind mei/begin juni voor het eerst gemaaid op de percelen met legfelbeheer. In combinatie met de afgesproken maaidata van 1, 8 en 15 juni zouden alle percelen in zo'n twee weken tijd gemaaid zijn. In verband met de aanwezigheid van nog relatief veel vogels met nog niet-vliegvlugge jongen, zijn op een aantal percelen de maaidata uitgesteld of kuikenland afgesproken tot 22 juni. Aangezien ook in die periode het weer onbestendig bleef zijn grote delen van de polders pas begin juli voor het eerst gemaaid. Het gevolg was wel dat de kans op overleving van de jonge weidevogels hiermee aanzienlijk is vergroot.

Het weidevogelseizoen is in de beide polders over het algemeen succesvol verlopen:

Beetskoog

In de Beetskoog is het BTS (brutto territoriaal succes) voor grutto (40 broedpaar) en tureluur (24 broedpaar), respectievelijk 79% en 73%. Van kievit (30 broedpaar) en scholekster (20 broedpaar) lag het broedsucces echter beduidend lager (67 en 45%). Met name van scholekster zijn er aan het einde van het seizoen weinig vogels met jongen geconstateerd (9 van de 20 broedparen). In de Beetskoog zijn toch zeker 5-6 broedpaar slobend aanwezig en zijn er enkele territoria van gele kwikstaart waargenomen. Tevens zijn er verschillende broedparen van krakeend geconstateerd, maar grote aantallen zijn tot laat in het seizoen als (broed)paar aanwezig en vogels met jongen zijn eigenlijk niet waargenomen. Als laatste zijn enkele broedpaar kuifeend en wilde eend aanwezig en zijn bij de plasdras-percelen een paartje kluut en een mogelijke vestiging van visdief geconstateerd. Nesten hiervan zijn echter niet waargenomen/gevonden.

Polder Mijzen

Het broedsucces (BTS) in Polder Mijzen was, ondanks de grotere aantallen weidevogels, minder hoog dan in de Beetskoog en betrof voor grutto (160 broedpaar) en tureluur (70 broedpaar) respectievelijk 55% en 60%. En ook hier was het broedsucces met betrekking tot kievit (90 broedpaar) en scholekster (50 broedpaar) vrij laag, respectievelijk 33% en 40%. Verder is in de Polder Mijzen vrij veel broedparen eenden aanwezig, waaronder 40 broedpaar wilde eend, 36 broedpaar krakeend, 24 broedpaar kuifeend, circa 18 broedpaar slobend, 8 broedpaar tafeleend en 2 broedpaar zomertaling. Tevens zijn er in de Mijzenpolder nog een 11 broedparen veldleeuwerik geconstateerd. Dat veldleeuwerik hier in grasland tot broeden komt, is voor het werkgebied van de ANV een unicum en worden vooral nog in de bollenvelden langs de kuststrook aangetroffen. Als laatste zijn er nog 10 broedpaar gele kwikstaart, 2 broedpaar graspieper en 2 broedpaar kleine plevier geconstateerd.

Op basis van het BTS en de waarnemingen in het veld, is er in beide polders sprake van enige predatie. Vrij regelmatig zweven er roofvogels als buizerd en bruine kiekendief boven de percelen en is in de Beetskoog waargenomen hoe een kleine mantelmeeuw een vrij groot scholekster jong naar binnen wilde schrokken. Gelukkig zaten beide ouders er letterlijk bovenop en wist het jong (deze keer) te ontkomen. Op basis van de BTS-gegevens en de verspreiding van de weidevogels wordt niet verwacht dat een vos aanwezig is in de Beetskoog, maar dat het nest- en jongen verlies vooral vanuit de lucht en wellicht door kleine marterachtigen wordt veroorzaakt.

In Polder Mijzen zijn in het voorjaar verschillende aangevreten eenden aangetroffen en wijst vermoedelijk wel op de aanwezigheid van een vos. Er zijn enkele wildcameravallen geplaatst, maar de aanwezigheid van de vos is niet aangetoond. Met uitzondering van een éénmalige waarneming van hermelijn zijn er geen roofdieren vastgesteld. In polder de Mijzen lijkt aan de hand van de broedsucces (BTS) met name in de kuikenfase (half juni) een deel van vogels met jongen te ontbreken. Ook een verplaatsing van vogels met jongen kan niet uit de telling worden herleid en ontbreken vogels met jongen met name in het centrale deel van de polder.

Ondanks de goede resultaten van dit jaar, zijn er voor komend seizoen wel enkele aandachtspunten en heeft voornamelijk te maken met de overleving van de jongen. Hiervoor dient een goed beeld te worden verkregen van de aanwezige predatie, zodat we hier op de juiste manier op in kunnen spelen.

Merijn Volkers
Coördinator weidevogels Wieringen
Veldmedewerker Mijzen Beetskoog
1-11-2021